

วิธีป้องกัน

1. ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ห้ามอาบน้ำให้เป็นเวลา 7 วัน
2. พยายามอย่าให้ถูกสัตว์กัดหรือข่วน แต่ถ้าหากถูกสัตว์เลียลูกด้วยนมกัดหรือข่วนให้รีบล้างบาดแผลโดยเร็วที่สุด โดยใช้สบู่ล้างบริเวณบาดแผล แล้วรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด



3. ให้กักสัตว์ที่กัดหรือข่วนคนไว้ 10 วัน ห้ามฆ่าโดยเด็ดขาด หากสัตว์ไม่มีอาการให้ปล่อย แต่ถ้าหากสัตว์มีอาการให้นำตัวส่งหน่วยงานควบคุมโรคในสัตว์ หรือปศุสัตว์ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป
4. อย่าเข้าไปใกล้สุนัขหรือสัตว์ที่มีอาการดูร้าย น้ำลายฟูมปาก หูตั้ง หางตก กลั้วน้ำ

โรคพิษสุนัขบ้า



ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลสันป่าเป่า



สาเหตุ

เกิดจากไวรัสเรบีส (Rabies virus) ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตทุกราย สัตว์นำโรค คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เชื้อไวรัสออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อ และเข้าสู่ร่างกายคนทางบาดแผลที่สัตว์กัดหรือข่วน

ระยะฟักตัว

คือระยะเวลาที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายจนเกิดอาการ ประมาณ 2 - 8 สัปดาห์

ระยะติดต่อ

สุนัข และแมวอาจแพร่เชื้อได้ 3 - 10 วัน ก่อนแสดงอาการ และตลอดเวลาที่ป่วย ในสัตว์ป่า เช่น ค้างคาว และสกังค์มีรายงานการปล่อยเชื้อในน้ำลายได้เร็วถึง 8 - 18 วัน ก่อนแสดงอาการ

อาการ

สมองและเยื่อสมองอักเสบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว คันหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกสัตว์กัด ต่อมาจะหงุดหงิด ตื่นเต้นไวต่อสิ่งเร้า (แสง เสียง กลิ่น) ม่านตาขยาย น้ำลายไหลมาก กล้ามเนื้อคอกระตุกเกร็งขณะที่ผู้ป่วยพยายามกลืนอาหาร หรือน้ำ ทำให้เกิดอาการ "กลืนน้ำ" เพื่อคลั่งสติกับอาการสงบ ซัก มักป่วยอยู่ประมาณ 2 - 6 วัน และเสียชีวิตเนื่องจากอัมพาตของ

กล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ



การรักษา

1. แยกผู้ป่วยให้อยู่ในห้องที่สงบ ปราศจากเสียงรบกวน แต่ไม่จำเป็นต้องปิดไฟ
2. ให้สารน้ำเข้าเส้นเลือดให้เพียงพอ
3. ผู้ให้การดูแลผู้ป่วย ควรใส่เสื้อกาวน์ เว้นตา ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย และปฏิบัติตามวิธีการป้องกันที่ได้มาตรฐาน

